

để tiêu thoát nước và vùng nguồn nước tưới bị thiếu cần chuyển đổi sang cây trồng cạn, vừa có hiệu quả kinh tế cao hơn lúa, vừa giảm thiểu sử dụng nước. Để chuyển đổi sang cây trồng cạn trên đất lúa cần tổ chức họp bàn để thống nhất thực hiện:

- Xây dựng cánh đồng lớn với diện tích sản xuất liên vùng, có điều kiện tương tự để chuyển đổi sản xuất cùng một loại nông sản.

- Chuẩn bị tốt giải pháp chống úng cho cây trồng cạn, như: Xây dựng hệ thống kênh tiêu nước; chọn chân đất cao để thoát nước; lên luống cao chống ngập úng.

- Liên kết, tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng với doanh nghiệp, cơ sở chế biến.

Trên đất lúa chủ động nước: Khuyến khích chuyển đổi sang Ngô, Đậu phụng là các cây trồng có đầu ra ổn định; trồng rau quả thực phẩm theo hợp đồng liên kết sản xuất. Có thể thực hiện các công thức luân canh:

- + Đậu phụng Đông Xuân - Ngô Hè Thu
- + Ngô/ hoặc Rau quả Đông Xuân - Đậu xanh/ hoặc Mè Xuân Hè - Ngô Hè Thu

III. SẢN XUẤT THEO HƯỚNG AN TOÀN

Lạm dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) vừa làm tăng giá thành sản xuất một cách không cần thiết, vừa là tác nhân chính làm mất an toàn vệ sinh thực phẩm nông sản và nông dân vẫn là người bị thiệt hại cuối cùng khi người tiêu dùng không tiêu thụ nông sản. Để sản xuất tạo ra sản phẩm trồng trọt an toàn, cần tuân thủ một số giải pháp kỹ thuật sau:

- Vệ sinh đồng ruộng, làm đất đúng kỹ thuật; không dùng thuốc trừ cỏ nhóm không chọn lọc (thuốc khai hoang) để trừ cỏ trên ruộng lúa, màu, bờ ruộng, mương.

- Phân bón, nước tưới: Tăng cường bón phân hữu cơ đã ủ hoai mục; chỉ sử dụng các loại phân vô cơ, phân vi sinh trong danh mục phân bón của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành, sử dụng đúng theo qui trình kỹ thuật. Không bón nhiều đạm, không bón muộn (riêng đối với cây rau ăn lá phải kết thúc bón trước thu hoạch 10 - 15 ngày). Hạn chế tối đa việc sử dụng chất kích thích sinh trưởng, điều hòa sinh trưởng. Không sử dụng phân tươi, nước ô nhiễm để tưới cho cây rau.

- Về quản lý dịch hại: Áp dụng chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý cây trồng tổng hợp (ICM),... Chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) khi thật cần thiết theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, khi sử dụng thuốc cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc “4 đúng”.

- + Đối với cây rau: Chỉ sử dụng các loại thuốc BVTV trong danh mục sử dụng cho cây rau khi thật cần thiết; ưu tiên sử dụng các loại thuốc sinh học, thảo mộc. Khi thu hoạch rau phải đảm bảo đủ thời gian cách ly của các loại phân bón và thuốc BVTV đã sử dụng.

- Việc thu hoạch, sơ chế, vận chuyển, bảo quản nông sản phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tránh bị hư hỏng, dập nát, nhiễm bẩn.

Bao bì chai lọ đựng thuốc BVTV phải bỏ vào nơi quy định để tiêu hủy, tạo môi trường sạch cho chính mỗi người

**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TỈNH QUẢNG NAM**

HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2018 - 2019



Tài liệu kỹ thuật phổ biến cho nông dân

Tháng 11 năm 2018